

Allergan
Aesthetics
an AbbVie company



Un tratamiento.^{1,2} Doble efecto.^{1,2}

Lifting inmediato y duradero con una
bioestimulación de colágeno sostenida,
para una piel más firme y rejuvenecida.^{2,3,*††}



Nueva jeringa

Atenuar el tiempo ¿Estás cubriendo las distintas necesidades de los pacientes?

La piel tiene necesidades multidimensionales²

Con el paso del tiempo, los niveles de ácido hialurónico, colágeno y elastina disminuyen de forma gradual, lo cual resulta en signos de envejecimiento visibles.²

Se necesita un enfoque integral para abordar el envejecimiento de la piel²

Los enfoques de agente único pueden no ser suficientes para abordar individualmente las complejas necesidades de la piel.²

HAmonyCa™ es un inyectable híbrido de doble efecto desarrollado para los pacientes con signos de flacidez facial^{1,2,8}

Pérdida de firmeza
de la piel


Flacidez leve a moderada
de la mejilla lateral

Arrugas de acordeón

Jowl leve a moderado


Fotografía tomada antes del tratamiento

Un producto. Doble efecto,^{1,2} HAmonyCa™



Efecto doble

HAmonyCa™ puede ofrecer un **lifting inmediato, duradero y sostenido** con una **estimulación prolongada del colágeno**^{1-3,*,†,¶} con resultados observados hasta un año.⁴



Mejora de la calidad de la piel

Ofrece a tus pacientes un tratamiento que puede **mejorar la calidad de la piel** restaurando **su elasticidad y firmeza**, para una piel rejuvenecida.^{2,*,†}



Conveniencia en un solo producto

Prueba la conveniencia de una jeringa **precargada, lista para usar**, sin necesidad de reconstitución (2 jeringas por caja).¹




Mejora tu experiencia con la nueva jeringa de HArmonyCa™

Descubre la nueva jeringa ergonómica diseñada para la comodidad de los profesionales de la salud⁵



El modelo de grip “Concept E” ha sido valorado con 9 sobre 10 en:⁵

- Ajuste a manos y dedos
- Seguridad de la jeringa en la mano
- Fricción de agarre
- Mayor nivel de confianza en que se inyecta la cantidad de producto deseado



Minimiza la fatiga muscular


Frente a los diseños estandar.⁵

Imágenes con fines ilustrativos

HArmonyCa™ ofrece un efecto lifting significativamente mayor al tratamiento con CaHA aislada^{3,‡}



Mayor capacidad de lifting de HArmonyCa™ vs. CaHA aislada durante 12 semanas post-inyección^{3,‡}



Degradación más lenta de HArmonyCa™ vs. CaHA aislada^{3,‡**}

HArmonyCa™ (que usa ácido hialurónico como transportador) tiene una degradación más lenta vs otros bioestimuladores (que usan carboximetilcelulosa como transportador)^{3,‡**}



Efecto lifting inmediato y sostenido^{3,‡}

El uso del ácido hialurónico en HArmonyCa™ puede permitir un efecto lifting inmediato y sostenido^{2,3,‡}

¿Tus pacientes podrían beneficiarse de un efecto lifting inmediato, duradero y sostenido?^{2,3,‡,¶}

CaHA: Hidroxiapatita de calcio

Un tratamiento bien tolerado^{1,7,††}

Los eventos adversos después de la inyección con HArmonyCa™ fueron en su mayoría leves y autolimitados^{6,7,††,††,***}

Los eventos adversos más comunes incluyen: eritema, edema, dolor, sensibilidad y picazón¹



Los pacientes se benefician de una interrupción mínima de su vida diaria después del tratamiento con HArmonyCa™ ya que pueden volver a trabajar y a sus actividades normales el mismo día¹

En un estudio clínico (N=403), 4.7% de los pacientes presentaron eventos adversos emergentes al tratamiento, la mayoría de los cuales fueron leves^{6,††,\$§}





Fotografía tomada 3 meses después del tratamiento.
La paciente, Anita recibió un total de 5 mL de HArmonyCa™
Los resultados individuales pueden variar.

Ofrece un tratamiento con alta satisfacción del paciente^{7,†††,†††}



4.1/5
● ● ● ● ○

Altos índices de satisfacción del tratamiento con HArmonyCa™ para la mayoría de los pacientes y probabilidad de repetir el tratamiento^{7,†††,†††}



La fotografía del antes se tomó antes de la inyección con HArmonyCa™. La fotografía del después se tomó 3 meses después del tratamiento.
La paciente, Lucy, recibió un total de 4.9 mL de HArmonyCa™
Los resultados individuales pueden variar.

Notas al pie

- * Resultados de un estudio prospectivo no-aleatorizado en el que se inyectó HArmonyCa™¹ en la región pre-auricular en 15 mujeres². El objetivo primario fue el cambio en el volumen al día 180. Los objetivos secundarios incluyeron los cambios en el lifting facial, el tiempo de integración al tejido y el perfil de seguridad²
- † Los exámenes de ultrasonido y elastografía se realizaron utilizando el ecógrafo Samsung HT30 y el ElastoScan HS30/XH30 (respectivamente Samsung y Healthcare Global). En comparación con el valor inicial, un aumento en la densidad, la viscoelasticidad y la firmeza del tejido se observó a los 60 días y luego se confirmó a los 90 días después del tratamiento. A los 180 días después del tratamiento se confirmó un aumento del colágeno en las áreas tratadas²
- * Resultados de un estudio pre-clínico animal con HArmonyCa™ con resultados durante 12 semanas que mostraron un lifting inmediato y sostenido después de la inyección³
- § HArmonyCa™ puede inyectarse en el área preauricular y en las ramas ascendentes y descendentes de la mandíbula¹²
- ¶ Se utilizó Vectra® (Canfield Scientific Inc.) para evaluar la elevación y el lifting de la piel midiendo los cambios en los vectores de tensión facial (VTF) a los 60, 90 y 180 días después del tratamiento. En comparación con los valores previos al tratamiento, los VTF aumentaron significativamente en todos los momentos con un aumento medio (rango intercuartil) de 2.2 (1.6 -2.2) mm, y 2.0 (1.7, 2.2) mm en los lados derecho e izquierdo, respectivamente, $p < 0.0001$ cada uno, 180 días después del tratamiento²
- ** En las 2 primeras semanas después de la inyección, el volumen perdido con la CaHA aislada fue significativamente mayor que el volumen perdido con HArmonyCa™ cuando se compara con el volumen inmediatamente después del tratamiento ($p < 0.05$)²
- ** Resultados de un estudio retrospectivo no intervencionista que evaluó la incidencia y la gravedad de los eventos adversos emergentes del tratamiento (TEAE) en adultos (N=403) tratados con HArmonyCa™ en seis clínicas de Brasil⁶
- §§ En un estudio retrospectivo no intervencionista (N=403), se observó 12 TEAEs en 11 pacientes relacionados con HArmonyCa™ y/o su procedimiento de inyección, de estos solo uno se consideró de gravedad moderada⁶
- ¶¶ En un análisis clínico posterior a la comercialización de HArmonyCa™ (N=162), se notificó un evento adverso (EA) grave no relacionado y un EA requirió intervención médica debido a la migración del producto en los labios y a una sobrecorrección⁷
- *** Por favor consulta las instrucciones de uso de HArmonyCa™ para obtener la lista completa de eventos adversos, contraindicaciones, advertencias y precauciones¹
- *** Seguimiento clínico poscomercialización de la seguridad y eficacia de HArmonyCa™ (N=162)⁷
- *** Evaluación del desempeño de la cohorte de seguimiento tardío (N=5) utilizando el cuestionario de satisfacción de la escala de Likert donde se informó una alta satisfacción del paciente (media de 4.1 de 5)⁷

Referencias

1. Allergan Aesthetics. HArmonyCa™ Lidocaine IFU. M032 V01. 2021.
2. Urdiales-Gálvez F et al. J Cosmet Dermatol. 2023;00:1-12.
3. Allergan Aesthetics. Data on File. HArmonyCa™ Lidocaine INT-HAR-2150036. Capacidad de lifting. Julio 2021. REF-84448.
4. Braz A, et. al. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2024;12(9):e6190.
5. K. Costelló et al. Diseño de una jeringa de relleno dérmico con un nuevo rendimiento ergonómico para mejorar la experiencia del usuario. Presentado en GEDET 2023. Palma de Mallorca. España.
6. Braz A et al. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2024;12(2):e5622.
7. Allergan Aesthetics. Data on File. HArmonyCa™ Lidocaine. Reporte del estudio clínico. Julio 2022. REF-99624.

Descubre una nueva era en el cuidado de la piel
de tus pacientes con el enfoque innovador de

Signature
by Allergan Aesthetics
an AbbVie company

